



---

**CIRCULAR Nº 003/2017 – EF/EM/3ª SÉRIE E PRÉ-VESTIBULAR – JARDIM DA PENHA**  
**ASSUNTO: CAMPANHA CONTRA A CAXUMBA**

Vila Velha, 30 de março de 2017

Senhores Pais/Responsáveis,

Por orientação da Vigilância Epidemiológica da PMV, teremos uma ação na escola coordenada pela equipe da Unidade de Saúde de Jardim da Penha.

A Diretora da Unidade de Saúde de Jardim da Penha, a senhora Karlla da Cunha Rocha Vieira, nos solicitou que:

- Todos os alunos do UP de Jardim da Penha tragam para escola, no período de **03 a 07 de abril**, as suas carteiras de vacinação devidamente identificadas. Essas carteiras serão analisadas, e os dados, enviados para o Ministério da Saúde, que avaliará as prováveis causas de estarem aparecendo casos de caxumba na cidade de Vitória.

Os alunos que nunca tiveram a doença ou não tomaram duas doses da “tríplice viral” serão vacinados na própria escola durante o período da campanha. Isso só poderá ser feito mediante autorização abaixo devidamente preenchida e assinada pelos pais ou responsáveis.

Os pais que assim o desejarem, também podem procurar a Unidade de Saúde mais próxima de sua casa para a vacinação. Mesmo que a família faça a opção de tomar a vacina fora da escola, precisamos que os alunos tragam a carteirinha de vacinação, bem como o formulário anexo preenchido e assinado.

Ressaltamos que a senhora Karlla avaliou que as ações implementadas pela escola foram adequadas e que não existe motivo para alarde.

Estamos certos de contar com a parceria de todos.

Qualquer dúvida, procurem a pedagoga da unidade.

**Equipe Pedagógica**



**Prefeitura Municipal de Vitória**  
Secretaria Municipal de Saúde  
Gerência de Vigilância em Saúde  
CIEVS/Coordenação de Vigilância Epidemiológica

## **CAXUMBA**

A **caxumba**, também chamada de papeira ou parotidite, é causada por um vírus, chamado *Paramyxovírus*. Seus primeiros sintomas são febre, calafrios, dores de cabeça, musculares e ao mastigar ou engolir, além de fraqueza. Uma das principais características da doença é o aumento das glândulas salivares próximas aos ouvidos, que fazem o rosto inchar. Nos casos graves, a **caxumba** pode causar surdez, meningite e, raramente, levar à morte. Após a puberdade, pode causar inflamação e inchaço doloroso dos testículos (orquite) nos homens ou dos ovários (ooforite) nas mulheres e levar à esterilidade. Por isso, é necessário redobrar a atenção nestes casos e ter acompanhamento médico.

A principal forma de prevenção é a vacina. A tríplice viral protege contra caxumba, rubéola e sarampo e está disponível na rede pública de saúde para pessoas entre 1 ano e 49 anos de idade.

Na rotina dos serviços públicos de saúde a vacina tríplice viral é administrada aos 12 meses de idade, e reforçada aos 15 meses por meio da aplicação da vacina tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela).

Indivíduos de 1 a 19 anos deverão receber duas doses das vacinas com componentes sarampo, caxumba e rubéola e de 20 a 49 anos, 1 dose.

Considerando que diversos Estados estão registrando surtos de caxumba e que o trânsito de pessoas entre eles e o nosso Estado é freqüente, além de que muitos adolescentes e adultos encontram-se com esquema vacinal incompleto, a Secretaria de Saúde de Vitória estará realizando ação de avaliação dos cartões e vacinação dos alunos do IBDH.

Para que seu filho(a) seja vacinado(a), orientamos que seja assinada a autorização abaixo.

Eu, \_\_\_\_\_, responsável pelo aluno  
\_\_\_\_\_ AUTORIZO meu filho a receber a vacina

tríplice viral.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Vitória, \_\_\_\_\_, de março de 2017