




Ciclo do HIV



▲ **Figura 2.12** • Etapas da reprodução de um HIV em uma célula humana. Analise a figura acompanhando a explicação no texto. (Representação sem escala, cores-fantasia.)

Viroses

Doença	Sintomas	Transmissão
Gripe	febre, dor de cabeça, obstrução nasal e tosse	gotículas de muco e saliva expelidas pelas vias respiratórias
Poliomielite	Paralisação dos membros	alimentos e objetos contaminados, secreções respiratórias
Febre Amarela	febre, náuseas, vômito, calafrios e pele amarelada	picada de mosquitos, com destaque para o <i>Aedes aegypti</i>
Raiva (Hidrofobia)	febre, delírio, convulsões, paralisia muscular e respiratória	saliva introduzida pela mordida de animais infectados
Hepatite viral	febre, anorexia, náuseas, icterícia	gotículas de muco e saliva; água contaminada com fezes
Herpes	feridas na mucosa oral ou genital	contato direto ou indireto (copo, toalha) com o portador
Dengue	febre, dores articulares, fotofobia, sangramento oral e nasal	picada do mosquito <i>Aedes aegypti</i>
Sarampo	febre, tosse, vermelhidão	saliva e muco de pessoas doentes
Rubéola	febre, erupções cutâneas	saliva e muco de pessoas doentes
Catapora (Varicela)	febre, enjôo, vômito e bolhas na pele	saliva e muco de pessoas doentes
Caxumba	inflamação e inchaço das parótidas; pode causar esterilidade	saliva e alimentos contaminados

Vacinas

IDADE	VACINAS	DOSE	DOENÇAS
Ao Nascer	BCG - ID Vacina contra hepatite b (1)	dose única 1ª dose	Formas grave de tuberculose Hepatite B
1 mês	Vacina contra hepatite b	2ª dose	Hepatite B
2 meses	Vacina Tetravalente (DTP+Hib) (2)	1ª dose	Difteria,tétano,coqueluche, menengite e outras infeccções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b.
	VOP (vacina oral contra pólio) VORH (vacina oral de rotavírus humano) (3)	1ª dose 1ª dose	Poliomelite (paralisa infantil) Diarréia por Rotavírus
4 meses	Vacina Tetravalente (DTP+Hib)	2ª dose	Difteria,tétano,coqueluche, menengite e outras infeccções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b.
	VOP (vacina oral contra pólio) VORH (vacina oral de rotavírus humano) (4)	2ª dose 2ª dose	Poliomelite (paralisa infantil) Diarréia por Rotavírus

6 meses	Vacina Tetravalente (DTP+Hib)	3ª dose	Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infeções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b.
	VOP (vacina oral contra pólio) Vacina contra hepatite b	3ª dose 3ª dose	Poliomelite (paralisa infantil) Hepatite B
9 meses	Vacina contra febre-amarela (5)	dose inicial	Febre amarela
12 meses	SRC (tríplice viral)	dose única	Sarampo, rubéola e caxumba
15 meses	VOP (vacina oral contra pólio) DTP (tríplice bacteriana)	reforço 1º reforço	Poliomelite (paralisa infantil) Difteria, tétano e coqueluche
4 - 6 anos	DTP (tríplice bacteriana) SRC (tríplice viral)	2º reforço reforço	Difteria, tétano e coqueluche Sarampo, rubéola e caxumba
10 anos	Vacina contra febre-amarela	reforço	Febre amarela